


Алкогольная смертность в России: уровни, тенденции, проблемы недоучета



Семенова Виктория Георгиевна



Причины смерти алкогольной этиологии, входящие в краткую номенклатуру причин смерти

- Алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие
- Хронический алкоголизм
- Алкогольная болезнь печени (алкогольный: цирроз, гепатит, фиброз)
- **Случайное отравление (воздействие) алкоголем**



Причины смерти алкогольной этиологии, входящие в МКБ-Х:

- Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя (F10);
- Дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем (G31.2);
- Алкогольная полиневропатия (G62.1);
- Алкогольная миопатия (G72.1);
- Алкогольная кардиомиопатия (I42.6);
- Алкогольная болезнь печени (алкогольный цирроз, гепатит, фиброз) (K70);
- Алкогольный гастрит (K29.2);
- Хронический панкреатит алкогольной этиологии (K86.0);
- Алкогольный синдром плода (Q86.0);
- Случайное отравление (воздействие) алкоголем (X45);
- Преднамеренное самоотравление и воздействие алкоголем (X65);
- Отравление и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями (Y15).




Алкобольные отравления:

- случайные отравления алкоболом (X45),
- отравления алкоболом с неопределенными намерениями Y15);
- преднамеренное самоотравление и воздействие алкоболом (X65)


Динамика смертности, обусловленной алкоголем, российского населения 20-39 лет в 2000-2009 гг.

мужчины



— отравления
— общие потери
— соматика


женщины



— отравления
— общие потери
— соматика


Динамика смертности, обусловленной алкоголем, российского населения 40-59 лет в 2000-2009 гг.

мужчины



— отравления
— общие потери
— соматика


женщины



— отравления
— общие потери
— соматика


Динамика смертности, обусловленной алкоголем, российского населения 60 лет и старше в 2000-2009 гг.

мужчины




— отравления
— общие потери
— соматика

женщины




— отравления
— общие потери
— соматика


Темпы роста совокупной алкогольной смертности взрослого населения России в 2000-2009 гг.




Темпы снижения смертности взрослого населения России от алкогольных отравлений в 2000-2009 гг.



Темпы роста смертности взрослого населения России от соматической патологии алкогольной этиологии в 2000-2009 гг.




Структура соматической смертности взрослого населения России, обусловленной алкоголем, в 2000 г.




Темпы роста смертности взрослого населения России от основных патологий, обусловленных алкоголем, в 2000-2009 гг.



Болезни органов
пищеварения



алкогольная
кардиомиопатия



Структура соматической смертности взрослого населения России, обусловленной алкоголем, в 2009 г.




■ Психические расстройства
■ Б-ни НС и органов чувств
■ алкогольная кардиомиопатия
■ Б-ни органов пищеварения

■ Психические расстройства
■ Б-ни НС и органов чувств
■ алкогольная кардиомиопатия
■ Б-ни органов пищеварения


Изменение структуры смертности, обусловленной алкоголем, российского населения в 2000-2009 гг.

мужчины



— отравления, 20-39 — соматика, 20-39
— отравления, 40-59 — соматика, 40-59
— отравления, 60+ — соматика, 60+

женщины



— отравления, 20-39 — соматика, 20-39
— отравления, 40-59 — соматика, 40-59
— отравления, 60+ — соматика, 60+



Источники и масштабы недоучета алкогольных смертей в рамках действующей краткой номенклатуры причин смерти:

- Алкогольная кардиомиопатия (другие болезни сердца);
- Отравления алкоголем с неопределенными намерениями (повреждения с неопределенными намерениями).

Масштабы недоучета:

- Трудоспособные – около 40%;
- Пожилые – около 37%

Повреждения с неопределенными намерениями (Y10-Y34), согласно МКБ-10




«этот блок включает случаи, когда доступной информации недостаточно, чтобы медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод о том, является ли данный инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения повреждений».



Региональная специфика учета алкогольных потерь:

- В настоящее время каждый российский регион учитывает алкогольные потери, руководствуясь собственными внутренними стандартами, на фоне полного отсутствия стандарта, единого для страны в целом.



В 2009 г. реальная смертность от алкогольных отравленийкратно превышала официально объявленную и в мужской и в женской популяции более чем на 10% российских территорий.



Единый фактор риска – злоупотребление алкоголем

- полный учет реальных потерь и правильная диагностика - сходство регионального профиля смертности российского населения от основных причин алкогольной этиологии.
- полный учет алкогольной смертности на фоне недостаточно четкой ее диагностики - обратная корреляция между региональным распределением смертности от отдельных причин.




Единый фактор риска – злоупотребление алкоголем

- Коэффициент ранговой корреляции между региональным распределением смертности от соматических причин алкогольной этиологии и алкогольными отравлениями составил 0,12 у мужчин и 0,23 у женщин.
- Доля территорий с пропорциональным профилем алкогольной смертности не превысила трети всех российских регионов.
- Соматическая алкогольная смертность недоучитывается более чем на 15% российских территорий, смертность от алкогольных отравлений – на 17% территорий (разница в 30 пунктов в ту или иную сторону).



Основные проблемы недоучета алкогольных потерь:

- Учет смертей по краткой номенклатуре причин смерти.
- Существующая нормативно-правовая база.



Согласно существующей нормативно-правовой базе:

- «Алкогольный» диагноз в случае смерти от соматических причин ставится только в 2 случаях: либо в случае пребывания умершего на учете в наркологическом диспансере, либо в присутствии нарколога.
- Анализ на алкоголь не является обязательным при проведении патологоанатомических исследований.
- Практика постановки «алкогольных» диагнозов в последнюю очередь, за отсутствием других вариантов.



Нозологические резервуары недоучета:

- Класс «Симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния» (R96-R99);
- кардиомиопатия неуточненная (I42.9);
- Неуточненные болезни органов пищеварения:
- токсическое поражение печени неуточненное (K71.9)
- другой и неуточненный цирроз печени (K74.6)
- Другие болезни печени (K76)
- Болезнь печени неуточненная (K76.9)
- Острый панкреатит (K85)
- Другие хронические панкреатиты (K86.1).



Первоочередная задача:

- **Формирование единого для страны стандарта учета алкогольных потерь, всех их источников и компонент.**